


# ကိုဗစ်ဇာရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီး နောက်လိုအပ်သော ပြန်လည်သန်စွမ်း ခြင်းဆိုင်ရာ ကုသမှုများ



ကိုဗစ်ဇာရောဂါ အပဋိဇက်အထိခံစားရသူများ ပြန်လည်  
နာလန်ထူထောင်လာနိုင်ရန်အတွက် အစောပိုင်းနှင့်  
ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရသော ပြန်လည်ထူထောင်ရေး  
ကုထုံးများတွင်



#worldptday

ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရပြီး နောက်ဆက်တွဲ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု လက္ခဏာ

ကိုဗစ်ဇာရောဂါကူးစက်ခံရပြီးနောက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသော လူ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း တွင် နောက်ဆက်တွဲ မောပန်းနွမ်းနယ်မှု လက္ခဏာများကို ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများ က သင့်အခြေအနေကို တိုးတက်လာစေဟူ၍ ခံစားရသည်ဖြစ်စေ၊ ပို၍ ဆိုးလာသည်ဟူ၍ ခံစားရသည်ဖြစ်စေ ၊ သင့်၏ အကြောအဆစ်ကပ်ညာရှင် သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပေးသူ တို့နှင့် တိုင်ပင်၍ သင့်၏ မောပန်းနွမ်းနယ်မှုနောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာ ကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန် တောင်းဆိုပါ ။ နောက်ဆက်တွဲမောပန်းနွမ်းနယ်မှုလက္ခဏာရှိသော သူများသည် မတူညီသော ပြန်လည်သန်စွမ်းမှုနည်းဗျူဟာ များကို လိုအပ်ပါသည်။