



ကိုဗစ်ဇာရောဂါပိုးကူးစက်ခံရပြီး  
နောက်လိုအပ်သော ပြန်လည်သန်စွမ်း  
ခြင်းဆိုင်ရာ ကုသမှုများ



Shutterstock / wavebreakmedia



အကြောအဆစ်နှင့်  
ကိုယ်ကာယပြန်လည်  
သန်စွမ်းမှုဆိုင်ရာကု  
ထုံးသည် ကိုဗစ်ဇာရ မှ  
ပြန်လည်ထူထောင်လာရန်  
အတွက် အရေးပါသော  
သော့ချက်ဖြစ်ပါသည်။

#worldptday

မိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရပြီး နောက်ဆက်တွဲ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု လက္ခဏာ

ကိုဗစ်ဇာရ ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးနောက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသော လူ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း တွင် နောက်ဆက်တွဲ မောပန်းနွမ်းနယ်မှု လက္ခဏာများကို ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများ က သင့်အခြေအနေကို တိုးတက်မလာစေဟူ၍ ခံစားရသည်ဖြစ်စေ၊ ပို၍ ဆိုးလာသည်ဟူ၍ ခံစားရသည်ဖြစ်စေ ၊ သင့်၏ အကြောအဆစ်ကပ်ညာရှင် သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပေးသူ တို့နှင့် တိုင်ပင်၍ သင့်၏ မောပန်းနွမ်းနယ်မှုနောက်ဆက်တွဲလက္ခဏာ ကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန် တောင်းဆိုပါ ။ နောက်ဆက်တွဲမောပန်းနွမ်းနယ်မှုလက္ခဏာရှိသော သူများသည် မတူညီသော ပြန်လည်သန်စွမ်းမှုနည်းဗျူဟာ များကို လိုအပ်ပါသည်။

